



# Lexique

UTILE POUR L'EXAMEN  
PROFESSIONNEL



Ordre des infirmières  
et infirmiers auxiliaires  
du Québec

## COORDINATION ET RÉDACTION DU PROJET

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

## AIDE FINANCIÈRE

Québec 

L'Ordre tient à souligner l'aide financière qui lui a été accordée pour réaliser ce document dans le cadre du Programme d'aide à la reconnaissance des compétences par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

# Table des matières

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>UTILISATION DU DOCUMENT</b> ..... | 4  |
| <b>A</b> .....                       | 5  |
| <b>B</b> .....                       | 7  |
| <b>C</b> .....                       | 8  |
| <b>D</b> .....                       | 9  |
| <b>E</b> .....                       | 11 |
| <b>F</b> .....                       | 13 |
| <b>G</b> .....                       | 14 |
| <b>H</b> .....                       | 15 |
| <b>I</b> .....                       | 16 |
| <b>L</b> .....                       | 17 |
| <b>M</b> .....                       | 18 |
| <b>N</b> .....                       | 19 |
| <b>O</b> .....                       | 20 |
| <b>P</b> .....                       | 21 |
| <b>Q</b> .....                       | 23 |
| <b>R</b> .....                       | 24 |
| <b>S</b> .....                       | 25 |
| <b>T</b> .....                       | 26 |
| <b>U</b> .....                       | 27 |
| <b>V</b> .....                       | 28 |

## UTILISATION DU DOCUMENT

L'Ordre met à votre disposition cette liste partielle de termes utilisés dans le cadre de l'exercice de la profession.

Une meilleure connaissance de la terminologie facilite la compréhension des informations mises à votre disposition dans les situations cliniques et les choix de réponses de l'examen professionnel.

Nous vous invitons à en faire une utilisation complémentaire à plusieurs autres outils permettant la révision de la terminologie, notamment les documents produits par l'Ordre à propos des préfixes, des suffixes et des abréviations, mais également les outils développés par l'Office québécois de la langue française tel que le Grand dictionnaire terminologique.

# A

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>abduction</b>           | éloigner du corps   |
| <b>abrasion</b>            | plaie superficielle, usure ou érosion de la peau par frottement (éraflure)  |
| <b>acouphène</b>           | bourdonnement, sifflement dans les oreilles   |
| <b>acuité sensorielle</b>  | sensibilité des sens  |
| <b>adduction</b>           | rapprocher du corps   |
| <b>aérophagie</b>          | avaler de l'air en mangeant   |
| <b>aérosol thérapie</b>    | emploi thérapeutique de certains médicaments réduits en aérosol, le brouillard ainsi formé, inhalé, pénètre profondément dans les voies respiratoires |
| <b>affect</b>              | état émotionnel communiqué par l'expression verbale et non verbale  |
| <b>agnosie</b>             | difficulté à reconnaître les objets   |
| <b>akinésie</b>            | lenteur d'initiation des mouvements avec une tendance à l'immobilité  |
| <b>alignement corporel</b> | respect de la ligne droite naturelle du système musculosquelettique   |
| <b>aménorrhée</b>          | absence de menstruation   |
| <b>amertume</b>            | sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur, lié à une injustice du sort  |
| <b>amitié</b>              | entretien d'une relation significative et agréable  |
| <b>amnésie</b>             | perte partielle ou totale de la mémoire   |
| <b>amplitude</b>           | étendue d'un mouvement, grandeur  |
| <b>anémie</b>              | diminution de la concentration d'hémoglobine dans le sang   |
| <b>angiome</b>             | accumulation visible de vaisseaux sanguins, tumeur bénigne de la peau   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>ankylose</b>            | perte totale ou partielle du mouvement propre à une articulation ayant pour origine une blessure, une maladie ou une intervention chirurgicale   |
| <b>anorexie</b>            | absence d'appétit  |
| <b>anticorps</b>           | complexe protéique produit par le système immunitaire adaptatif dans un organisme vivant pour détecter et neutraliser les agents pathogènes de manière spécifique  |
| <b>antidote</b>            | substance utilisée pour contrer ou neutraliser un poison ou un médicament dangereux  |
| <b>antigène</b>            | substance que le système immunitaire peut reconnaître et qui stimule une réponse immunitaire   |
| <b>anurie</b>              | absence de sécrétion d'urine par le rein   |
| <b>anxiété</b>             | sentiment d'inconfort et de tension que ressent la personne face à la vie ou sentiment d'un danger imminent s'accompagnant de malaises, d'agitation, de désarroi et d'anéantissement devant ce danger.<br><i>termes associés : angoisse, appréhension, crainte, détresse, effroi, inquiétude, menace, peur, nervosité.</i> |
| <b>aphasie</b>             | perte de la parole ou de la compréhension du langage   |
| <b>aphonie</b>             | perte de la voix   |
| <b>apnée</b>               | arrêt respiratoire plus ou moins prolongé  |
| <b>appétit</b>             | envie de manger  |
| <b>asphyxie</b>            | difficulté ou arrêt de la respiration par obstacle mécanique   |
| <b>atonie</b>              | perte de tonus   |
| <b>atrophie musculaire</b> | perte de volume des muscles  |
| <b>attelle</b>             | qui maintient, immobilise une fracture   |
| <b>attitude</b>            | disposition à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un<br><i>termes associés : comportement, conduite</i>  |
| <b>auscultation</b>        | mode d'exploration clinique qui consiste à écouter les bruits produits par les organes   |
| <b>auto-injecteur</b>      | dispositif permettant l'injection d'une dose d'adrénaline en cas de réaction allergique  |

# B

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>bactérie</b>        | microbe vivant   |
| <b>bactériurie</b>     | présence de bactéries dans les urines  |
| <b>ballonnement</b>    | gonflement de l'abdomen par des gaz contenus dans l'intestin, météorisme<br><i>termes associés : flatuosité, gaz</i> |
| <b>bégaïement</b>      | débit de la parole perturbé  |
| <b>bol alimentaire</b> | portion d'aliments avalés  |
| <b>bradycardie</b>     | ralentissement du rythme cardiaque   |
| <b>bradypnée</b>       | ralentissement de la respiration   |
| <b>bronchoscopie</b>   | examen endoscopique de la trachée et des bronches  |

# C

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>cauchemar</b>     | rêve pénible dont l'élément dominant est l'angoisse<br><i>terme associé : mauvais rêve</i>  |
| <b>cécité</b>        | perte de la vue   |
| <b>cicatrice</b>     | partie visible d'une lésion du derme après la réparation du tissu   |
| <b>cicatrisation</b> | guérison de la plaie  |
| <b>cognition</b>     | capacité d'acquérir des connaissances   |
| <b>cohérence</b>     | rapport logique   |
| <b>colonoscopie</b>  | examen visuel du côlon par l'intermédiaire d'une sonde  |
| <b>communication</b> | action de transmettre un message, liaison<br><i>termes associés : avouer, confier, contacter, converser, dialoguer, écrire, émettre, parler, rapporter, répondre, révéler</i> |
| <b>compréhension</b> | se faire une idée, discerner, saisir  |
| <b>confusion</b>     | altération de la conscience   |
| <b>constipation</b>  | retard dans l'évacuation des selles dû à une rétention plus ou moins prolongée des résidus dans le côlon  |
| <b>contention</b>    | immobilisation physique ou chimique forcée  |
| <b>convulsion</b>    | contractions involontaires et instantanées  |
| <b>crampe</b>        | contraction musculaire douloureuse et transitoire, involontaire   |
| <b>crépitation</b>   | bruit respiratoire anormal que l'on entend à l'auscultation dans certaines affections, en particulier une pneumonie   |
| <b>croyances</b>     | opinion, acceptation de quelque chose comme étant vrai<br><i>termes associés : assentiment, certitude, conviction, doctrine, dogme</i>  |
| <b>cyanose</b>       | coloration bleuâtre des téguments due à un trouble circulatoire ou respiratoire   |
| <b>cystite</b>       | inflammation aiguë ou chronique de la vessie  |

# D

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>débridement</b>      | enlèvement du tissu nécrotique d'une plaie   |
| <b>défécation</b>       | expulsion des matières fécales   |
| <b>déglutition</b>      | action d'avaler  |
| <b>démence</b>          | diminution des facultés intellectuelles et désintégration  |
| <b>dépression</b>       | baisse de moral, aversion d'activité pouvant affecter le comportement, les émotions et le bien-être physique d'un individu<br><i>termes associés : abattement, mélancolie, tristesse</i> |
| <b>derme</b>            | couche de peau la plus épaisse qui se trouve sous l'épiderme   |
| <b>déshydratation</b>   | perte d'eau, perte de liquide  |
| <b>désinfection</b>     | destruction de microorganismes   |
| <b>désintéressement</b> | détachement, absence d'intérêt<br><i>termes associés : apathie, désœuvrement, inoccupation, passivité</i>  |
| <b>deuil</b>            | réaction physiologique et psychologique à une perte ou à une atteinte émotionnelle   |
| <b>dialyse</b>          | diffusion de molécules en solution à travers une membrane semi-perméable   |
| <b>diaphorèse</b>       | sudation; transpiration abondante<br><i>termes associés : exsuder, dégouliner, moiteur, sueur</i>  |
| <b>diarrhée</b>         | évacuation plus ou moins fréquente du contenu intestinal avec une proportion importante de liquide   |
| <b>digestion</b>        | transformation des aliments en nutriments assimilables   |
| <b>domicile</b>         | lieu où une personne réside<br><i>termes associés : chez-soi, demeure, foyer, maison, résidence</i>  |
| <b>douleur</b>          | sensation pénible perçue en un ou plusieurs points de l'organisme<br><i>termes associés : inconfort, malaise, névralgie, souffrance</i>  |
| <b>dysarthrie</b>       | difficulté à articuler due à une perte de contrôle des muscles de la parole  |
| <b>dyslalie</b>         | difficulté à prononcer due à une malformation ou une lésion de l'appareil lié à la parole  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>dyslexie</b>     | difficulté à lire et à comprendre ce qu'on lit   |
| <b>dysménorrhée</b> | menstruations douloureuses   |
| <b>dyspepsie</b>    | difficulté à digérer   |
| <b>dysphagie</b>    | difficulté à manger, à avaler  |
| <b>dysphasie</b>    | trouble du développement du langage  |
| <b>dysphorie</b>    | instabilité de l'humeur  |
| <b>dyspnée</b>      | difficulté respiratoire<br><i>termes associés : gêne respiratoire, respiration difficile, respiration laborieuse</i>   |
| <b>dystrophie</b>   | trouble de la nutrition d'un organe avec les lésions qui en sont la conséquence : engourdissement, ralentissement des mouvements, diminution de la sensibilité |
| <b>dysurie</b>      | difficulté à uriner avec une douleur plus ou moins vive, allant de la simple tension du périnée à la sensation de brûlure vésicale avec spasmes paroxystiques  |

# E

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>ecchymose</b>        | infiltration de sang dans les tissus cutanés  |
| <b>écholalie</b>        | répétition de mots sans qu'ils aient de sens pour celui qui les prononce  |
| <b>effet secondaire</b> | effet indésirable ou non souhaité d'un médicament   |
| <b>endormissement</b>   | moment où l'on s'endort   |
| <b>engelure</b>         | lésion de la peau due au froid, siégeant surtout au niveau des doigts et des orteils                            |
| <b>engourdissement</b>  | perte de sensation complète ou partielle et s'accompagne souvent de sensations anormales, comme des picotements |
| <b>ennui</b>            | absence d'intérêt associé à de la tristesse, sentiment de vide  |
| <b>entérale</b>         | par le tube digestif, par opposition à la voie parentérale  |
| <b>entorse</b>          | atteinte des ligaments articulaires sans luxation   |
| <b>entourage</b>        | personnes qui vivent auprès d'autrui  |
| <b>énurésie</b>         | affection caractérisée des mictions involontaires et inconscientes pendant le sommeil                           |
| <b>épidémie</b>         | propagation subite et rapide d'une maladie contagieuse à un grand nombre de personnes d'une région              |
| <b>épiderme</b>         | couche superficielle de la peau   |
| <b>épuisement</b>       | perte de force physique ou psychologique<br><i>termes associés : fatigue, lassitude</i>                         |
| <b>érythème</b>         | rougeur ou inflammation de la peau qui blanchit à la pression   |
| <b>espoir</b>           | confiance, expectative  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>estime de soi</b> | opinion favorable sur soi-même; sentiment de sa propre valeur et de sa compétence<br><i>termes associés : confiance en soi, s'accomplir, s'épanouir, se réaliser, se sentir utile</i> |
| <b>excréta</b>       | ensemble des déchets de la nutrition rejetés hors de l'organisme (urine, selles, sueur, bile)   |
| <b>expectoration</b> | produit normal ou pathologique présent dans les voies respiratoires et expulsé par la toux<br><i>termes associés : sécrétion, crachat</i>   |
| <b>expiration</b>    | expulsion de l'air des poumons  |
| <b>exsudat</b>       | écoulement produit par une plaie<br><i>termes associés : sérosité, suintement</i>   |
| <b>extension</b>     | étirement   |

# F

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>faim</b>     | sensation du besoin de manger<br><i>termes associés : dévorer, grignoter, s'alimenter, se nourrir, repas, collation, contenu du plateau, déjeuner, dîner, souper</i>                    |
| <b>famille</b>  | ensemble de personnes qui ont des liens de parenté par le sang ou par alliance (traditionnellement : père, mère et enfants)<br><i>termes associés : couple, ménage, proches, réseau</i> |
| <b>fatigue</b>  | sensation de lassitude causée par l'effort, l'excès de dépense physique ou intellectuelle   |
| <b>fébrile</b>  | état d'agitation, d'excitation, de nervosité intense, parfois relié à la fièvre   |
| <b>fécalome</b> | accumulation considérable de matières fécales durcies dans l'ampoule rectale ou le côlon terminal   |
| <b>fièvre</b>   | syndrome caractérisé par l'élévation de la température du corps avec accélération du pouls et de la respiration   |
| <b>fissure</b>  | fente étroite et peu profonde d'un tissu ou d'un organe   |
| <b>flexion</b>  | plier   |
| <b>foi</b>      | croyance en une religion ou en un dogme d'une religion, par une adhésion profonde de l'esprit du cœur qui apporte la certitude  |
| <b>fracture</b> | rupture partielle ou complète d'un os   |
| <b>fratrie</b>  | frères, sœurs   |
| <b>frissons</b> | tremblement inégal et irrégulier, accompagné d'une sensation de froid<br><i>termes associés : claquer des dents, grelotter, soubresaut, tressaillement</i>                              |

# G

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>gastro-entérite</b> | inflammation aiguë ou chronique des muqueuses gastriques et intestinales d'origine virale ou bactérienne            |
| <b>gastroscopie</b>    | examen direct de la cavité gastrique au moyen d'un gastroscopie (tube flexible avec caméra)                         |
| <b>gastrostomie</b>    | ouverture chirurgicale de l'estomac   |
| <b>gavage</b>          | introduction d'aliments dans l'estomac ou le petit intestin à l'aide d'un tube                                      |
| <b>gelure</b>          | lésion due au froid dont la gravité, l'étendue et la profondeur sont variables selon l'intensité du refroidissement |
| <b>globe vésical</b>   | accumulation anormale d'urine dans la vessie  |
| <b>glucide</b>         | hydrate de carbone, sucre   |
| <b>glycosurie</b>      | présence de glucose dans l'urine  |

# H

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>hématurie</b>               | excrétion simultanée de sang et d'urine  |
| <b>hémiplégie</b>              | paralysie n'affectant qu'un seul côté du corps   |
| <b>hémoptysie</b>              | évacuation par la bouche de sang rouge clair provenant des voies respiratoires   |
| <b>hémothorax</b>              | épanchement de sang dans la cavité pleurale  |
| <b>hygiène</b>                 | science qui apprend à conserver et à améliorer la santé<br><i>termes associés : assainissement, salubrité</i>  |
| <b>hyperactivité</b>           | besoin impératif de bouger   |
| <b>hyperesthésie</b>           | augmentation excessive de la sensibilité à certains stimuli qui se traduit par des sensations désagréables ou douloureuses                                     |
| <b>hyperextension</b>          | étirement maximal, excessif, forcé   |
| <b>hyperpnée</b>               | respiration plus rapide et plus profonde que la respiration normale  |
| <b>hypertension</b>            | augmentation de la pression artérielle   |
| <b>hyperthermie</b>            | élévation de la température du corps au-dessus de la normale<br><i>terme associé : avoir chaud</i>   |
| <b>hypertrophie musculaire</b> | augmentation de la masse musculaire  |
| <b>hyperventilation</b>        | augmentation du débit ventilatoire alvéolaire se traduisant par une diminution du CO <sub>2</sub>  |
| <b>hypnotique</b>              | qui provoque le sommeil  |
| <b>hypotension</b>             | diminution de la pression artérielle   |
| <b>hypothermie</b>             | abaissement de la température du corps au-dessous de 35 °C<br><i>termes associés : avoir froid, être gelé, être frigorifié, perte de chaleur, se refroidir</i> |

# I

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>ictère</b>                | coloration jaunâtre  |
| <b>image corporelle</b>      | perception de son apparence physique   |
| <b>immobilité</b>            | état de ce qui est ou paraît immobile, sans mouvement<br><i>termes associés : ankylosé, cloué, alité, fixe, figé, inaction, inertie, paralysie</i> |
| <b>immunité</b>              | acquisition par l'organisme de propriétés de défense nouvelles et spécifiques à la suite d'une infection   |
| <b>impuissance</b>           | sentiment de pouvoir et de moyens insuffisants<br><i>termes associés : impossibilité, inaptitude, incapacité, inefficacité</i>                     |
| <b>inappétence</b>           | diminution ou absence d'appétit; absence de besoin, de désir   |
| <b>incontinence urinaire</b> | impossibilité de retenir les urines ou émission involontaire d'urine   |
| <b>infection</b>             | envahissement de l'organisme par des parasites   |
| <b>infection nosocomiale</b> | infection par un virus ou une bactérie issue du milieu hospitalier   |
| <b>inflammation</b>          | douleur, rougeur, œdème, chaleur   |
| <b>inhalation</b>            | respiration d'air ou des vapeurs d'eau contenant des substances médicamenteuses  |
| <b>insomnie</b>              | privation de sommeil   |
| <b>inspiration</b>           | aspiration d'air dans les poumons  |
| <b>intercostal</b>           | entre les côtes  |
| <b>intimité</b>              | espace personnel, espace vital   |
| <b>intubation</b>            | introduction par la bouche ou par le nez d'un instrument dans la trachée (laryngoscope)  |
| <b>irradiation</b>           | propagation du siège de la douleur vers des régions plus ou moins éloignées  |
| <b>irritation</b>            | rougeur par friction, par prurit; colère ou exaspération   |

# L

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>langage non verbal</b> | communiquer sans l'usage de la parole  |
| <b>langage verbal</b>     | communiquer par la parole  |
| <b>lavement</b>           | laver un organe (système digestif) interne par injection d'une solution  |
| <b>laxatif</b>            | terme générique sous lequel on regroupe tous les médicaments provoquant la défécation  |
| <b>léthargie</b>          | état pathologique caractérisé par un sommeil profond et prolongé dans lequel les fonctions de la vie semblent suspendues   |
| <b>logorrhée</b>          | besoin intarissable de parler  |
| <b>loisir</b>             | activité solitaire ou en groupe réalisée volontairement pendant les temps libres<br><i>termes associés : distraction, divertissement, occupation, passe-temps, s'amuser, se changer les idées, se distraire, s'occuper</i> |
| <b>luxation</b>           | déplacement de deux surfaces articulaires  |

# M

|   |  |
|---|--|
| <b>maladie pulmonaire (obstruction chronique)</b> | ensemble de maladies pulmonaires chroniques et obstructives (bronchite chronique – asthme – emphysème)                 |
| <b>mémoire</b>                                    | capacité de se souvenir; rétention et retour d'information   |
| <b>ménorragie</b>                                 | exagération de l'écoulement menstruel, soit en quantité, soit en durée   |
| <b>métrorragie</b>                                | hémorragie utérine survenant en dehors des règles  |
| <b>miction</b>                                    | émission d'urine<br><i>termes associés : élimination urinaire, uriner</i>  |
| <b>mobilité</b>                                   | capacité de bouger   |
| <b>monologue</b>                                  | action de parler seul  |
| <b>morosité</b>                                   | humeur triste  |
| <b>mouvement</b>                                  | changement de position, d'endroit<br><i>termes associés : bouger, circulation, déplacement, déambulation, mobilité</i> |
| <b>mutisme</b>                                    | incapacité volontaire ou involontaire de la parole   |

# N

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>narcolepsie</b> | exagération pathologique du besoin de dormir, tendance irrésistible au sommeil  |
| <b>nausée</b>      | envie de vomir<br><i>termes associés : haut-le-cœur, mal de cœur</i>  |
| <b>nébuliseur</b>  | appareil de vaporisation projetant une substance en fines gouttelettes<br><i>termes associés : aérosol, atomiseur</i> |
| <b>nécrose</b>     | mort tissulaire   |
| <b>nettoyage</b>   | action de débarrasser des saletés   |
| <b>nodule</b>      | corps palpable, dur et circonscrit  |
| <b>nutriment</b>   | élément assimilable contenu dans l'aliment  |
| <b>nycturie</b>    | excrétion urinaire à prédominance nocturne  |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>odeur</b>           | émanation volatile qui se dégage d'un corps et qui est perçue par l'appareil olfactif<br><i>termes associés : arôme, effluve, émanation, parfum, senteur</i> |
| <b>œdème</b>           | <i>accumulation de liquide dans les tissus</i>   |
| <b>œdème à godet</b>   | type d'œdème où l'empreinte du doigt reste imprégnée quelques secondes sur une partie du corps œdémateuse  |
| <b>ordonnance</b>      | document qui contient les prescriptions  |
| <b>orthèse</b>         | appareil de support, de protection, d'immobilisation   |
| <b>orthopnée</b>       | dyspnée liée à la position couchée, obligeant le client à s'asseoir ou à se lever  |
| <b>oxygénothérapie</b> | traiter en administrant de l'oxygène   |

# P

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>paralyse</b>         | absence de motricité   |
| <b>paraplégie</b>       | paralyse de deux membres identiques  |
| <b>parole</b>           | mots qui expriment la pensée   |
| <b>perception</b>       | représentation, sensation  |
| <b>peur</b>             | émotion intense provoquée par la perception d'un danger réel ou imaginaire<br><i>termes associés : appréhension, crainte, frayeur, panique, terreur</i>  |
| <b>physiothérapie</b>   | traitement par les exercices, l'eau, la chaleur et le froid  |
| <b>picotement</b>       | sensation de piqûres répétées  |
| <b>pigmentation</b>     | accumulation d'une couleur   |
| <b>plaie</b>            | discontinuité tégumentaire avec ou sans perte de tissu<br><i>termes associés : abrasion, atteinte cutanée, blessure ouverte, contusion, écorchure, lacération, lésion superficielle profonde</i> |
| <b>pneumothorax</b>     | épanchement d'air dans la cavité pleurale  |
| <b>pollakiurie</b>      | mictions d'urine trop fréquentes sans augmentation du volume d'urine produite en 24 heures   |
| <b>polydipsie</b>       | besoin excessif de boire   |
| <b>polyphagie</b>       | besoin excessif de manger et absence de satiété  |
| <b>polyurie</b>         | augmentation du volume urinaire produit en 24h   |
| <b>position dorsale</b> | allongé sur le dos   |
| <b>position Fowler</b>  | position semi-assise où le dos est dans un angle d'environ 45 à 60 degrés  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>posture</b>             | position corporelle   |
| <b>prandial</b>            | relatif aux repas   |
| <b>prescription</b>        | ordonnance rédigée par un médecin pour l'administration d'un médicament à une personne  |
| <b>pression artérielle</b> | tension dans les artères  |
| <b>prière</b>              | s'adresser à Dieu, à un être surnaturel, communication spirituelle avec Dieu<br><i>termes associés : communion, chapelet, invocation, méditation, messe, rite religieux</i> |
| <b>prophylaxie</b>         | prévenir le développement des maladies  |
| <b>prothèse</b>            | appareil de remplacement  |
| <b>prurit</b>              | démangeaison  |
| <b>pudeur</b>              | réserve, gêne relative au corps   |
| <b>pulsation</b>           | pouls, rythme cardiaque   |
| <b>pyrexie</b>             | état fébrile, synonyme de fièvre  |
| <b>pyrosis</b>             | sensation de brûlure au tube digestif   |
| <b>pyurie</b>              | présence de pus dans les urines   |



Q

**quadriplégie**

paralyse des membres inférieurs et supérieurs ainsi que du tronc

# R

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>râle</b>                      | bruit entendu à l'auscultation pulmonaire dû à la mobilisation des sécrétions dans les conduits bronchiques     |
| <b>réceptivité</b>               | aptitude à assimiler  |
| <b>réflexe</b>                   | acte nerveux produit sans une volonté consciente  |
| <b>repos</b>                     | délassement, arrêt, immobilité<br><i>termes associés : détente, quiétude, relâchement, relaxation, répit</i>    |
| <b>résidu vésical</b>            | quantité d'urine qui demeure dans la vessie après une miction   |
| <b>résistance</b>                | propriété d'un tissu qui ne cède pas  |
| <b>respiration sifflante</b>     | bruit respiratoire sifflant lors de l'expiration  |
| <b>respiration superficielle</b> | inspiration et expiration trop courtes, donc peu profondes  |
| <b>rétenion urinaire</b>         | impossibilité d'émettre naturellement par l'urètre une partie ou la totalité de l'urine contenue dans la vessie |
| <b>retrait</b>                   | action de se replier sur soi comme pour se défendre, se retirer d'un lieu                                       |
| <b>rêve</b>                      | activité psychique durant le sommeil<br><i>termes associés : imagination, fantaisie, inspiration, rêverie</i>   |
| <b>rotation</b>                  | tourner sur son axe   |
| <b>rougeur</b>                   | érythème qui blanchit à la pression<br><i>terme associé : irritation</i>  |

# S

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>satiété</b>                     | besoin de boire ou de manger satisfait   |
| <b>saturation en O<sub>2</sub></b> | mesure de la quantité d'oxygène transportée par le sang  |
| <b>scoliose</b>                    | déviations latérales de la colonne   |
| <b>sécurité</b>                    | <i>état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit à l'abri du danger</i><br><i>termes associés : assurance, tranquillité d'esprit</i>            |
| <b>sialorrhée</b>                  | hyper salivation   |
| <b>sieste</b>                      | court repos généralement en journée<br><i>termes associés : assoupissement, somme, sommeil, somnolence</i>   |
| <b>socialisation</b>               | intégration à la collectivité  |
| <b>soif</b>                        | sensation du besoin de boire<br><i>termes associés : se désaltérer, se rafraîchir, s'hydrater, siroter</i>   |
| <b>soliloque</b>                   | discours d'une personne qui se parle à elle-même   |
| <b>solitude</b>                    | état d'abandon, de séparation, dans lequel se sent l'être humain face à la société<br><i>termes associés : délaissement, éloignement, isolement, retranchement</i> |
| <b>soupir</b>                      | expiration forte   |
| <b>spasme</b>                      | <i>contraction musculaire de courte durée et involontaire</i>  |
| <b>spirométrie</b>                 | mesure des volumes d'air mobilisés par les mouvements respiratoires  |
| <b>stimulation</b>                 | incitation, excitation   |
| <b>stimulus</b>                    | excitation, agent déclencheur  |
| <b>succion</b>                     | aspiration de liquide au moyen d'appareils   |
| <b>surdité</b>                     | perte de l'audition  |
| <b>surveiller</b>                  | s'assurer de, observer, vérifier   |

# T

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>tachycardie</b>            | augmentation du rythme cardiaque   |
| <b>tégument</b>               | peau   |
| <b>température corporelle</b> | degré d'intensité de chaleur de l'organisme<br><i>termes associés : auriculaire, axillaire, buccale, cutanée, rectale</i>  |
| <b>tésisme</b>                | impression de tension douloureuse, de corps étranger au niveau de l'anus ou de la vessie   |
| <b>tic</b>                    | mouvement convulsif, conscient et intempestif (involontaire)   |
| <b>tirage</b>                 | dépression de la paroi thoracique pendant de fortes inspirations quand l'entrée de l'air dans le thorax est difficile (sus sternal – sous sternal – intercostal) |
| <b>tonus musculaire</b>       | état de tension permanente et naturelle  |
| <b>torticolis</b>             | irritation du muscle sternomastoïdien  |
| <b>toux</b>                   | expiration brusque, volontaire ou réflexe, due le plus souvent à une affection des voies respiratoires   |
| <b>trachéotomie</b>           | intervention chirurgicale consistant à aboucher la trachée à la peau   |
| <b>transpiration</b>          | excrétion de sueur   |
| <b>trauma</b>                 | blessure, lésion locale produite par une violence extérieure   |
| <b>tremblement</b>            | oscillation qui agite le corps   |
| <b>tristesse</b>              | peine, mélancolie  |
| <b>tuteur</b>                 | personne chargée de surveiller les intérêts d'un mineur ou d'un incapable majeur placé sous le régime de la tutelle  |

# U

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>unité</b>         | secteur d'un établissement de santé où est soignée une clientèle souffrant généralement de pathologies similaires ou nécessitant le même genre de soins |
| <b>unité fermée</b>  | unité où l'on peut circuler librement à l'intérieur de l'unité mais non à l'extérieur   |
| <b>unité ouverte</b> | unité où l'on peut circuler librement à l'intérieur de l'unité comme à l'extérieur  |
| <b>urée</b>          | ultime produit de dégradation des protéines, excrété par les reins  |

# V

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>vaccination</b> | administration d'un vaccin soit pour protéger l'organisme contre une maladie déterminée, soit pour combattre une maladie en évolution |
| <b>valeur</b>      | ensemble de croyances et d'attitudes de l'individu vis-à-vis un sujet   |
| <b>vésicule</b>    | papule contenant un liquide clair, beaucoup plus petite qu'une phlyctène  |
| <b>virus</b>       | agents pathologiques non vivants  |
| <b>vitamine</b>    | nutriment essentielle à la croissance et à l'équilibre  |
| <b>vomissement</b> | rejet violent du contenu du tube digestif à l'extérieur<br><i>termes associés : régurgiter, restituer, vomissure</i>                  |